

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .РФ
Оренбургский областной кожно-венерологический диспансер

460000 г. Оренбург.
ул. Кобзева, 39

Телефоны: глав. врач
47-91-09
регистратура 47-21-28

от 22. 05. 98 г. № 175
На № 175

О т ч е т
о клиническом применении ферментированно-гидролизованной
молочной сыворотки СГОЛ - I - 40.
/Разработчик фирма "Интерлакт"/.

Лечебно-профилактический продукт СГОЛ-І-40 предоставленный ООО "БТЛ" применялся у 10-ти больных с заболеваниями кожи, после антибиотикотерапии уретритов различной этиологии с явлениями дисбактериоза желудочно-кишечного тракта различной степени.

1. Больной М. -24 лет, Д-з: Урогенитальный хламидиоз, дисбактериоз кишечника после антибиотикотерапии.
2. Больной К. - 34 лет, Д-з: Хроническая экзема кистей, дисбактериоз кишечника.
3. Больной Б. - 32 лет, Д-з: Дисбактериоз кишечника на фоне антибиотикотерапии хронического уретрита.
4. Больной М-н. - 35 лет. Д-з: Хронический простатит. Дисбактериоз кишечника.
5. Больной А. - 38 лет, Д-з: Распространенная истинная экзема. Хронический гастроэнтероколит, дисбактериоз кишечника.
6. Больная С. -4 лет, Д-з: Распространенныйнейродермит. Дисбактериоз кишечника.
7. Больной Н. - 28 лет, Д-з: Хламидиоз. Хронический тотальный уретрит. Дисбактериоз кишечника после антибиотикотерапии.
8. Большой Ш. - 24 лет, Д-з: Хроническая гонорея. Тотальный уретрит. Дисбактериоз кишечника.

9. Больной В. - 34 лет, Д-з Хронический простатит. Дисбактериоз кишечника после антибиотикотерапии.
10. Больная М. - 28 лет, Д-з Распространенный нейро-дермит. Дисбактериоз кишечника.

Продукт назначался взрослым по I ст.ложке 3 раза в сутки 5 дней, затем 2 дня перерыв, курс 4 недели /ребенку по I чайной ложке 2 раза/.

Лечение Л.П.П. СГОЛ происходило на фоне традиционных методов лечения.

Явление непереносимости не отмечалось ни у одного из больных. Через две недели после начала лечения все больные отмечали уменьшение болей в области живота, улучшение работы кишечника, нормализацию стула.

Больные заметили повышение работоспособности, появление чувства бодрости. У больных хроническими дерматозами при осмотре кожных покровов выявлено устойчивое разрешение высыпаний; новые элементы не появлялись. Также отмечали постепенное исчезновение зуда.

Через 4 недели все больные заявили о хорошей переносимости, высокой эффективности продукта СГОЛ-І-40.

Таким образом продукт СГОЛ-І-40 высоко эффективен при лечении дисбактериоза кишечника и сопутствующих хронических заболеваний кожи и других органов.



Консультант
рологический
диспансер

Каряков В.П.