

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5
ГОРОДСКОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ОТЗЫВ

О результатах применения сыворотки молочной ферментированной СГОЛ 1-40 в лечении больных колопроктологического отделения.

В течении двух недель с 18 августа 2003 г. в отделении колопроктологии для определения клинической активности сыворотки молочной ферментированной СГОЛ 1-40 препарат использовался у 30 больных, перенесших операции по поводу заболеваний прямой и толстой кишки. Из них - 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет. Из 30 больных 20 перенесли геморроидэктомию закрытым методом, 5 человек – операции по поводу свищей прямой кишки, 5 человек – электроэксцизию полипов прямой кишки.

Препарат применялся по схеме: 1 столовая ложка 2 раза в день в течении 10 суток. Одновременно назначалась комплексная терапия, включающая послабляющие средства.

При анализе результатов применения препарата отмечено:

1. Диспептических явлений при применении препарата не отмечено.
2. На 3 – 4 сутки больные отмечали улучшение аппетита и, как следствие, уменьшение слабости.
3. У всех больных отмечалось уменьшение явлений метеоризма, чувства переполнения в области желудка.
4. Одним из критериев нормализации функции кишечника у больных перенесших операцию, является количество и режим приема послабляющих средств. Применение сыворотки молочной ферментированной СГОЛ 1-40 позволило сократить объем слабительных средств в 1,5 раза. Одновременно отмечено снижение длительности приема слабительных препаратов в среднем на 5 -7 суток.

Учитывая удовлетворительный клинический эффект применения сыворотки молочной ферментированной СГОЛ 1-40, препарат рекомендован для приема больным, перенесшим операцию на прямой и толстой кишке.

Аппробацию провели врачи колопроктологического отделения МУЗ ГКБ № 5:


Аминов А.С.



Котомина Е.М.



Нестеренко Д.М.



Плаксин В.В.



Заведующий колопроктологическим отделением, главный колопроктолог г. Челябинска - Боронин Е.В.

