

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
работе МГМИ
проф. Чудаков
"до 1996" 1996



ОТЧЕТ

о клиническом применении препарата "СГОЛ-1-40"
произведенном ООО "Пролакт".

Испытания проведены кафедрой акушерства и гинекологии МГМИ (Зав. кафедрой - проф. Герасимович Г.И.) на базе здравпункта завода "Термопласт" и женской консультации №2 г. Минска.

Препарат "СГОЛ-1-40" - это обогащенная лактатом натрия гидролизованная молочная сыворотка, произведенная и представлена на испытание ООО "Пролакт". Вместе с препаратом представлены следующие документы:

1) Гигиенический сертификат №1-П/11 - 1073 на сыворотку молочную, сброженную "СГОЛ-1", выданный государственным комитетом санэпиднадзора Российской Федерации.

2) Ксерокопия удостоверения №08-33-18942 Республики Беларусь о государственной гигиенической регистрации добавки пищевой "СГОЛ-1-40"

3) Ксерокопия заключения №08-03-10-27777 Минздрава Республики Беларусь и Белорусского НИ санитарно-гигиенического института по результатам гигиенической оценки обогащенной лактатом натрия гидролизованной молочной сыворотки "СГОЛ-1-40", произведенной ООО "Пролакт".

Применен препарат у 13 женщин с урогенитальным кандидозом как второй этап лечения для восстановления нормальной флоры влагалища. Препарат применялся местно в виде тампонов (10-15 шт препарата на 1 тампон). Тампон вводился во влагалище на сутки - на курс 15-18 дней. Исследования проводились под контролем кольпоскопии, мазков на гонорею и флору, мазков на атипичные клетки и на чувствительность к антибиотикам. Получены положительные результаты.

Получены также положительные результаты при применении препарата "СГОЛ-1-40" в виде тампонов у пациенток с псевдоэррозией шейки матки. Курс лечения - 10 тампонов. Лечение также проводилось под контролем кольпоскопии, мазков на гонорею и флору, на атипичные клетки и на чувствительность к антибиотикам.

Достивший положительный результат при применении препарата "СГОЛ-1-40" у гинекологических больных, мы считаем возможным использование "СГОЛ-1-40" повсеместно в акушерско-гинекологических стационарах и женских консультациях в Республике Беларусь. Препарат может быть рекомендован для местного применения у больных с урогенитальным кандидозом, у беременных с кандидозом влагалища, при псевдоэрозиях шейки матки, при синильных кольпитах.

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии
МГМИ
профессор

СГОЛ

Герасимович Г.И.

Ассистент кафедры
акушерства и гинекологии
МГМИ

Г.И.

Смирнова Т.А.

Зав. женской консультации
№2 г. Минска

А.Е.

Аркальев А.Е.