

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ И ПРОКТОЛОГИИ (2 Х.О.)

ОТЗЫВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИМЕНЕНИЯ СЫВОРОТКИ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ
СГОЛ I-40 В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СТАЦИОНАРА 2 Х.О.

В течение двух недель с 18 марта 2003 г. в порядке подтверждения клинической активности сыворотки ферментированной СГОЛ I-40 препарат использовался у 25 больных с хирургической инфекцией по схеме: I столовая ложка 2 раза в день повторными курсами по 5 дней с 2-х дневным перерывом.

Препарат назначался на фоне комплексной терапии с использованием антбиактериальных средств.

По результатам наблюдений отмечено:

1. Переносимость препарата хорошая, лишь в 2х случаях отмечена тошнота в начале приёма в течение 1-2 дней.
2. Побочных эффектов от приёма препарата не выявлено, за исключением появления изжоги у одной больной с сопутствующим гастритом.
3. У всех больных отмечена нормализация функции кишечника.
4. В послеоперационном периоде у больных быстрее обычного исчезали признаки интоксикации.
5. Больные отмечали улучшение аппетита, уменьшение слабости.
6. У одного больного с сопутствующим панкреатитом отмечено исчезновение болей, улучшение переносимости пищи.
7. При использовании СГОЛ I-40 у больного Р. 51 года с затянувшимся процессом формирования колостомы отмечено быстрое очищение раны, формирование свища и установление периодичности огорожнения кишечника, что позволило больному самостоятельно осуществлять уход за собой и выписаться из стационара для подготовки к следующему этапу операции.

Таким образом, 2х недельное применение препарата СГОЛ I-40 позволило отметить позитивные результаты в лечении больных.

Зав. отделением
II апреля 2003 г.

РЫШКОВ И.Л.

